

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 1 - 7 - 87484290



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 99
du 21 Mai 1987

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| : - <u>CULTURES LEGUMIERES</u> : | Oïdium, pucerons, mildiou et | : |
| : | teigne du poireau. | : |
| : - <u>ARBRES FRUITIERS</u> : | Cochenilles du murier, mouche de | : |
| : | la cerise, carpocapse des prunes. | : |
| : - <u>VIGNE</u> : | Premiers foyers de mildiou, oïdium, cicadelles, | : |
| : | sorties de tordeuse de la grappe | : |

CULTURES LEGUMIERES

**** Oïdium des curcubitacées**

Dès les premières taches, intervenez en effectuant une pulvérisation avec un fongicide systémique.

bupirimate	NIMROD
fenarimol	RUBIGAN
imazalil	FUNGAFLOR
triadimefon	BAYLETON
pyrazophos	AFUGAN

Préventivement, effectuez des traitements au soufre sur feuillage sec et lorsque la température est inférieure à 30°.

**** Pucerons des cultures légumières**

Intervenir localement sur les foyers. Respecter les délais avant récolte.

Produits utilisables en lutte intégrée

pyrimicarbe	PIRIMOR	délai 7 jours
-------------	---------	---------------

**** Mouche de la carotte**

La mouche s'observe actuellement sur les champs de carottes. Si les carottes doivent être récoltées après le 5 juin, effectuez une pulvérisation abondante sur le feuillage avec :

chlorfenvinphos	BIRLANE
ou diethion	RHODOCIDE

P.1/10

**** Mildiou des cultures légumières**

Maintenir une protection après les pluies et après les arrosages par aspersion.

- Vous pouvez utiliser :

--> des produits de surface à base de captafol, cuivre, chloro - thalonil, dichlofluanide, folpel, (pomme de terre), mancozébe, metirame de zinc, (pomme de terre), manébe, propinébe, ou zinébe.

--> des produits pénétrants à base de cymoxanil, metalaxyl (pomme de terre), carbendazyme + folpel.

**** Teigne du poireau**

Surveillez les infestations de teigne.

Matières actives utilisables : azinphos, deltamethrine, cyfluthrine.

ARBRES FRUITIERS

**** Cochenilles du murier**

Intervenir dès réception avec un des produits suivants :

methidathion	40 g ma/hl	ULTRACIDE
parathion	30 g ma/hl	N.S.

**** Mouche de la cerise**

Vous pouvez réaliser un traitement contre les larves dès maintenant
Renouveler tous les 10 jours.
Respecter les délais avant récolte.

<u>Délai avant récolte</u>	<u>Matière active</u>	<u>g.M.A./hl</u>	<u>Spécialités commerciales</u>
7 jours	dimethoate	30	Nombreuses spécialités
7 jours	formothion	50	ANTHIO - FORT
7 jours	malathion	100	DRIVOX 50, MALIXOL L50
15 jours	diazinon	30	BASUDINE
15 jours	fenthion	50	LEBAYCID

**** Carpocapse des prunes**

L'intervention contre la première génération n'est pas nécessaire sauf si vos parcelles ont subi une forte attaque en 1986. Dans ce cas, vous pouvez réaliser un traitement avec

phosalone	AZOPHENE FLO ZOLONE
azinphos	N.S.

.../...

VIGNE

**** Mildiou**

Les premiers foyers primaires de mildiou ont été observés à BRAVONE, PIANICCIA, ALERIA, le 19 mai. Ces foyers sont pour l'instant limités, mais si ce temps couvert et humide persiste, des repiquages sont à craindre. Un traitement est donc recommandé sur la Côte Orientale, dans ces zones. Ailleurs aucun foyer n'a été observé.

**** Oïdium**

Bien protéger les cépages sensibles.

La liste jointe récapitule les différents produits utilisables.

**** Cicadelles vertes**

On les observe en toutes zones mais le seuil de une larve par feuille n'est jamais atteint. Il est inutile de traiter.

**** Tordeuses de la grappe**

Les vols essentiellement constitués d'eudémis ont été importants dans les régions d'ALERIA, PIANICCIA, GHISONACCIA et AGHIONE.

Toutes nos observations dans ces zones ont montré que les pontes étaient toutefois restées faibles.

Le nombre de glomérules dénombrés est également toujours resté très en dessous du seuil de 200 glomérules pour 100 grappes. Un traitement est donc inutile sauf cas exceptionnels.

Dans les autres régions, le vol est toujours resté très faible, et toute intervention est également inutile.

Dernières nouvelles

- Quelques foyers de cladosporiose sur tomates ont été observés sous serre. Intervenir curativement avec un produit à base de triforine.

- Sorties de cicadelles de la Flavescence Dorée

- 18 mai à FIGARETTO

- 19 mai dans le TARAVO

- 20 mai à CAURO

Ne pas intervenir pour le moment

PMA

PRODUITS DE TRAITEMENT CONTRE L'OIDIUM

MATIERE ACTIVE			SPECIALITES COMMERCIALES				OBSERVATIONS
famille	nom	dose g/ha	nom	firmes	doses / ha	cout/ha F.h.taxe	
LES SOUFRES							
soufre sublimé pour poudrage		20000 30000	FLUIDOSOUFRE SUBLIMIOR	R.S.R Sédagri	20à30 kg/ha	82,0 à 123,0	les poudrages assurent une très bonne pénétration à l'intérieur des souches.
soufre trituré pour poudrage		30000 40000	NOMBREUSES SPECIALITES	/	30à40 kg/ha	73,5 à 98,0	action secondaire intéressante sur érinose et acariose.
soufre mouillables		10000	NOMBREUSES SPECIALITES	/	12,5 kg	95,0 en moyenne	A la cadence de 14 jours, respectez la dose de 12,5 kg/ha.
LES PRODUITS PENETRANTS (Inhibiteur de la Synthèse de l' Ergostérol)							
formamide	triforine	285	DENARIN SAPROL	Schéring Prochim	1,5 L	95,4	Ces produits pénètrent à l'intérieur du feuillage, mais ne migrent que très localement, sans atteindre les nouveaux organes formés après traitement.
pyridine	pyrifénox	30 40	DORADO	La Quino	0,15 L 0,20 L	54,0 72,0	
pyrimidine	fénarimol	12 18	RUBIGAN 4	E. Lilly	0,30 L 0,45 L	55,4 83,1	
triazole	nuarimol	12 18	TRIMIDAL	Sandoz	0,10 L 0,15 L	64,0 96,0	S'utilisent à la cadences de 14 jours n'ont pas besoin d'être renouvelés après une pluie.
	dichlobutrazol	63	VIGIL	Sopra	0,50 L	77,0	
	flusilazol	20 30	OLYMP 10 EC	Du Pont	0,20 L 0,30 L	45,1 67,6	Dès le début floraison, traitez les rangs face par face en visant la zone fructifère afin de bien atteindre les grappes. Sur cépages sensibles (carignan,) et /ou dans les parcelles attaquées les années antérieures, utilisez obligatoirement la dose forte dès le début de la floraison en respectant une cadence maximum de 14 jours entre deux applications.
	hexaconazol	15 20	ANVIL liq.	Sopra	0,30 L 0,40 L	58,2 77,6	
	myclobutanil	20 30	SYSTHANE 12E	Procida	0,16 L 0,24 L	48,8 73,2	
	penconazole	15 25	TOPAZE	C. Geigy	0,15 0,25 L	52,2 87,0	
	triadiméfon	50 75	BAYLETON 5	Bayer	1,00kg 1,50kg	66,3 99,5	
	triadiménol	25 38	BAYTAN 5 liq	Bayer	0,50 L 0,75 L	41,1 61,7	
ASSOCIATIONS SOUFRE - PRODUIT PENETRANT							
	soufre + dichlobutrazol	3000 + 38	FRIOL GRAPOL	R.S.R Prochim	5,00kg	70,5	poudre pour poudrage.
	soufre + pyrifénox	15000 + 25	DORADO poudrage	La Quino	20,00kg	130,0	
AUTRES FONGICIDES DE SYNTHESE							
dérivé du phénol	dinocap	210	KARATHANE liquide	Sandoz Rhodia	0,60 L	88,0	Produit très peu rémanent
			KARATHANE	Pépro	1,15kg	77,2	
sulfamide	dichlofluanide	1250	EUPARENE	Bayer	2,50	120,0	
SPECIALITES MIXTES (mélange de matières actives homologué sur plusieurs maladies dont l'oïdium)							
fénarimol + phoséthyl-AL + folpel	10 1500 750	ALLIANCE	Pépro	3,00kg	206,7	Ces produits homologués sur oïdium de la vigne, sont également actif sur mildiou et black-rot. A utiliser en cas de risques simultanés pour ces diverses maladies.	
penconazole + folpel	15 1500	TOPAZE MULTI	C. Geigy	3,00	140,4		
pyrifénox + mancozèbe	40 2800	FURADO	La Quino	4,00kg	184,0		
triadiméfon + cymoxanil + propinèbe	50 120 1450	DIAMETAN B	Bayer	2,50kg	195,0	Attention: En fonction des maladies les doses peuvent être différentes de celles indiquées dans ce tableau	

TABLEAU: SPECIALITES HOMOLOGUEES SUR OIDIUM DE LA VIGNE.
VIGIL: ne pas utiliser sur cépages CABERNET et CABERNET SAUVIGNON.

COUT (hors taxes) / ha

D'après "LE COUT des FOURNITURES EN VITICULTURE JANVIER 1987" ITV, SUAD, H. MARCELIN & L. FLECK. Ces coûts ne sont qu'indicatifs. Ils ne doivent être utilisés qu'à titre de comparaison. Il est donc normal qu'ils ne correspondent pas exactement aux prix que vous pourrez rencontrer chez votre fournisseur.